

PROPUESTA DE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE SEMILLAS DE SORGO (*Sorghum bicolor*) PARA LA SIEMBRA ORIGINARIAS DE INDIA

Artículo 1.- Establecer los requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación de semillas de sorgo (*Sorghum bicolor*) para la siembra originarias de India.

Artículo 2.- Los requisitos fitosanitarios para la importación son:

1. Permiso Fitosanitario de Importación, emitido por el área respectiva de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zootecnario.
2. Certificado Fitosanitario de Exportación otorgado por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de India que consigne lo siguiente:

2.1. Declaración adicional:

“El envío viene libre de *Acidovorax avenae* subsp. *avenae*, *Cenchrus pedicellatus*, *Cenchrus polystachios*, *Cirsium arvense*, *Commelina benghalensis*, *Desmostachya bipinnata*, *Heliotropium europaeum*, *Hibiscus trionum*, *Richardia brasiliensis*, *Setaria viridis*, *Solanum elaeagnifolium*, *Sonchus arvensis*, *Striga angustifolia*, *Striga asiatica* y *Striga densiflora* mediante certificado de laboratorio Nro. “.....” (Escribir el número de diagnóstico de laboratorio)”.

2.2. Tratamientos fitosanitarios:

- Tratamiento fitosanitario de desinfección pre embarque con Fludioxonil 2,5% + Metalaxyl-M 1% - FS, en dosis de 2 ml/kg de semilla u otro producto de similar acción en dosis adecuadas para *Peronosclerospora sorghi*, *Alternaria longissima*, *Balansia oryzae-sativae*, *Bipolaris sorghicola*, *Bipolaris pluriseptata*, *Chrysosporium indicum*, *Claviceps africana*, *Claviceps sorghi*, *Cochliobolus pallescens*, *Colletotrichum graminicola*, *Curvularia eragrostidis*, *Curvularia hawaiiensis*, *Curvularia aerea*, *Curvularia penniseti*, *Curvularia spicifera*, *Curvularia trifolii*, *Fusarium acuminatum*, *Fusarium nygamai*, *Paramyrothecium roridum*, *Sphacelia sorghi* y *Sporisorium sorghi*.
- Tratamiento fitosanitario de desinfestación pre embarque para *Araecerus fasciculatus*, *Cadra cautella*, *Carpophilus mutilatus*, *Corcyra cephalonica*, *Cryptolestes pusillus*, *Liposcelis bostrychophila*, *Liposcelis entomophila*, *Liposcelis paeta*, *Plodia interpunctella*, *Tenebroides mauritanicus* y *Trogoderma granarium* con fosfuro de aluminio al 56% en las siguientes dosis:

Dosis, g $\text{PH}_3 \text{ m}^{-3}$	Tiempo de exposición mínimo para productos almacenados a granel, silo, bolsas o sacos apilados	Temperatura mínima
10	20 días	10°C
8	5 días	20°C

O productos de similar acción en dosis adecuadas.

3. El envío viene libre de suelo y cualquier material extraño.
4. El envío estará contenido en empaques nuevos de primer uso y deben estar libres de cualquier material extraño.
5. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso.

