

¡Amigo palmicultor! conoce sobre la pudrición del cogollo

RECONOCIMIENTO DE PRINCIPALES SÍNTOMAS EN CAMPO



La Pudrición del Cogollo (PC), inicia con el amarillamiento (clorosis) de las hojas nuevas de la parte central llamada cogollo y termina en la pudrición de los tejidos con emisión de un olor fétido.



MANEJO INTEGRADO DE LA PC

- Realizar rondas fitosanitarias periódicas con personal capacitado en el reconocimiento de la PC y hacer diagnóstico de casos iniciales.
- Controla la gualpa (*Rhynchophorus palmarum*) mediante un sistema de trampeo masivo.
- Realizar prácticas en vivero y en campo.



Trampa para gualpa



Identificación de la PC

PRÁCTICAS EN VIVERO



Usa semillas certificadas



Utiliza agua de buena calidad



Implementa un pediluvio para desinfectar el calzado



Certifica tu vivero



Denuncia el traslado ilegal de palma

PRÁCTICAS DE CAMPO



Evita la siembra en lotes donde estuvo la enfermedad



Maneja los drenajes



Maneja la nutrición de tu cultivo

ERRADICACIÓN DE PALMAS CON PC

Las palmas con PC en estado avanzado deben ser erradicadas con el fin de disminuir la fuente de inóculo, para que no se conviertan en foco de diseminación.



Erradicación con palilla



Erradicación con motosierra



Erradicación con excavadora



Erradicación con inyección

RECUERDA: Un buen Manejo Integrado en tu plantación te ayudará a evitar la PC; para mayor información comunícate con los técnicos de AGROCALIDAD.

Agencia de Regulación y Control Fito y Zootécnico



República del Ecuador



Gobierno del Encuentro

Juntos lo logramos