

ALGUNAS MEDIDAS A CONSIDERAR

- Erradicar las plantas con síntomas de PC.

- Contar con un plan de manejo fitosanitario que incluya un sistema de trapeo para la gualpa (*Rhynchophorus palmarum*), con el fin de evitar la diseminación de PC y otras plagas.



- Desinfectar los vehículos que ingresen y salen de zonas de producción, centros de acopio, extractoras, viveros, centros de investigación entre otros.



- Movilizar material vegetal de palma (plantas, fruta, etc.) con la Guía de Movilización de AGROCALIDAD.



- Cubrir el vehículo con carpa durante la movilización.



¡Moviliza tu fruta con seguridad!

www.agrocalidad.gob.ec



@agrocalidadecuador



@AgrocalidadEC

Agencia de Regulación y
Control Fito y Zootecnario



Juntos
lo logramos

Dirección: Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Ed. MAG, piso 9
Teléfono: +593 2 382 8860 • Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador

PUDRICIÓN DEL COGOLLO (PC)



Agencia de Regulación y
Control Fito y Zootecnario




República
del Ecuador



Juntos
lo logramos

¿QUÉ ES LA PC?

Se conoce como “PC” a la pudrición del cogollo de la palma, que es el síntoma final ocasionado por un trastorno patológico.



¿QUÉ CAUSA LA PC?

A pesar de toda la investigación realizada, no se ha podido establecer el agente causal de la PC.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA PC?

- a) Amarillamiento (clorosis) de las hojas nuevas del cogollo.



- b) Lesiones necróticas en la hoja flecha (bandera).



- c) Doblamiento y muerte de la flecha.



- d) Pudrición del cogollo (tejido meristemático) con emisión de un olor fétido.



¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?

Utilizar materiales tolerantes (híbridos) y realizar un manejo integral del cultivo contribuyen a reducir el efecto devastador de la PC.

No existe un tratamiento específico para recuperar una planta con PC, resultando la ERRADICACIÓN una medida para prevenir la dispersión a otros lugares.

MÉTODO DE ERRADICACIÓN

El método de erradicación recomendado por AGROCALIDAD es el de Inyección al Estípite; el cual consiste en:

- a) Formar 3 orificios alrededor de la palma a 50 cm desde el suelo.



- b) Inyectar 150 – 250 ml de herbicida / palma.



- c) Sellar los orificios con cemento.



- d) Aplicar al cogollo 1 litro de solución de insecticida al 0,5 %.



Si requieres apoyo en la erradicación, comunícate con AGROCALIDAD!