### MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA QUE LA PLAGA

#### **NO LLEGUE A TU CULTIVO**

Siembra material de propagación de sitios registrados en AGROCALIDAD.





Revisa el cultivo para detectar

No movilices material de siembra de plantas afectados (colinos,









Realizar un control de malezas nabitualmente.





Evita el ingreso de animales

No movilices plantas enfermas ni as deseches en canales de riego y





Es importante estar informado.

# ¿QUÉ HACER CUANDO SE **ENCUENTRAN SÍNTOMAS?**

- NO toques las plantas enfermas ni el suelo adyacente.
- Informar inmediatamente a AGROCALIDAD, para que un técnico acuda al sitio a confirmar la presencia de la plaga.



(f) @agrocalidadecuador (y) @AgrocalidadEC



Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario





lo logramos

Dirección: Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Ed. MAG, piso 9 **Teléfono:** +593 2 382 8860 • **Código Postal:** 170518 / Quito - Ecuador



lo logramos

#### ¿QUÉ ES Foc R4T?

Es una de las plagas más destructivas que atacan al banano y al plátano. La raza 4 tropical no está presente en Ecuador; sin embargo los síntomas son similares a los que ocasiona la Raza 1, causante de la devastación del banano en las adas 50'y 60'.

Los esfuerzos deben ser preventivos!

## ¿CÓMO RECONOCERLO EN EL CULTIVO?



adura en la base el pseudotallo



arillamiento uniforme de as nojas desde el margen foliar hacia la nervadura



Acortamiento los entrenudos



rtamiento de a noja bandera

I pseudotallo y cormo resentan una coloración afé rojiza



I marchitamiento inicia or las hojas inferiores, ue se secan y quedan olgadas del pseudotallo



almente la lanta muere, ero permanece e pie





coloración de aces vasculares de fuera hacia adentro



## LA PLAGA PUEDE **DISPERSARSE A TRAVÉS DE:**





