

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA QUE LA PLAGA NO LLEGUE A TU CULTIVO

Siembra material de propagación de sitios registrados en AGROCALIDAD.



Revisa el cultivo para detectar plantas enfermas.



No movilices material de siembra de plantas afectados (colinos, rebrotes o hijos).



Usa herramientas exclusivas en la finca.



Desinfecta las herramientas permanentemente.



Desinfecta el calzado y vehículos que ingresan a la finca.




Realizar un control de malezas habitualmente.



Evita el ingreso de animales domésticos al cultivo.



No movilices plantas enfermas ni los desechos en canales de riego y drenaje.



Es importante estar informado. Asiste a las capacitaciones.



¿QUÉ HACER CUANDO SE ENCUENTRAN SÍNTOMAS?

- **NO** toques las plantas enfermas ni el suelo adyacente.
- Informar inmediatamente a AGROCALIDAD, para que un técnico acuda al sitio a confirmar la presencia de la plaga.

FUSARIUM RAZA 4 TROPICAL (Foc R4T)



www.agrocalidad.gob.ec



@agrocalidadecuador



@agrocalidad.ec



@AgrocalidadEC

Agencia de Regulación y
Control Fito y Zoosanitario



República
del Ecuador



Juntos lo
hacemos posible

Dirección: Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Ed. MAG, piso 9
Teléfono: +593 2 382 8860 • Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador

Agencia de Regulación y
Control Fito y Zoosanitario



República
del Ecuador



Juntos lo
hacemos posible

¿QUÉ ES Foc R4T?

Es una de las plagas más destructivas que atacan al banano y al plátano. La raza 4 tropical no está presente en Ecuador; sin embargo los síntomas son similares a los que ocasiona la Raza 1, causante de la devastación del banano en las décadas 50'y 60'.

¡Los esfuerzos deben ser preventivos!

¿CÓMO RECONOCERLO EN EL CULTIVO?



Rajadura en la base
del pseudotallo



Acortamiento
de los entrenudos



Amarillamiento uniforme de
las hojas desde el margen
foliar hacia la nervadura



Acortamiento de
la hoja bandera

El pseudotallo y corno
presentan una coloración
vascular café rojiza



El marchitamiento inicia
por las hojas inferiores,
que se secan y quedan
colgadas del pseudotallo



Decoloración de
haces vasculares de
afuera hacia adentro



Finalmente la
planta muere,
pero permanece
de pie



LA PLAGA PUEDE DISPERSARSE A TRAVÉS DE:

