MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA QUE LA PLAGA

NO LLEGUE A TU CULTIVO

Siembra material de propagación de sitios registrados en AGROCALIDAD.





Revisa el cultivo para detectar

No movilices material de siembra de plantas afectados (colinos,





Desinfecta las herramientas





Desinfecta el calzado y vehículos

Realizar un control de malezas





Evita el ingreso de animales

No movilices plantas enfermas ni as deseches en canales de riego y





Es importante estar informado. Asiste a las capacitaciones.

¿QUÉ HACER CUANDO SE **ENCUENTRAN SÍNTOMAS?**

- NO toques las plantas enfermas ni el suelo adyacente.
- Informar inmediatamente a AGROCALIDAD, para que un técnico acuda al sitio a confirmar la presencia de la plaga.





@agrocalidadecuador @ @agrocalidad.ec @ @AgrocalidadEC





Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario





hacemos posible

Dirección: Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Ed. MAG, piso 9 **Teléfono:** +593 2 382 8860 • **Código Postal:** 170518 / Quito - Ecuador





¿QUÉ ES Foc R4T?

Es una de las plagas más destructivas que atacan al banano y al plátano. La raza 4 tropical no está presente en Ecuador; sin embargo los síntomas son similares a los que ocasiona la Raza 1, causante de la devastación del banano en las décadas 50'y 60'.

¡Los esfuerzos deben ser preventivos!

¿CÓMO RECONOCERLO EN EL CULTIVO?



Rajadura en la base del pseudotallo



Amarillamiento uniforme de las hojas desde el margen foliar hacia la nervadura



Acortamiento de los entrenudos



Acortamiento de la hoja bandera

El pseudotallo se presentan con una coloración café rojiza



El marchitamiento inicia por las hojas inferiores, que se secan y quedan colgadas del pseudotallo



Finalmente la planta muere, pero permanece de pie





Decoloración de haces vasculares de afuera hacia adentro



DISPERSARSE A TRAVÉS DE:





