

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE BROTES DE *Ralstonia solanacearum* Raza 2

🌴 Síntomas

1 Amarillamiento de la hoja bandera que empieza por los márgenes




2 El racimo frutal presenta una maduración desigual y la pulpa de la fruta una pudrición interna



3 En hijuelos, las hojas se amarillan, se secan y se mueren



🌴 Manejo de zona roja



- Utilizar ropa, botas y herramientas exclusivas.
- Restringir el paso del personal.
- Bloquear los sistemas de riego y drenaje.
- No arrojar material a zonas de cultivo o fuentes de agua.
- No permitir la cosecha ni la extracción de material de propagación de esta zona.
- Capacitar al personal.

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario

Ante la sospecha de Ralstonia Comunícate con Agrocalidad

1 800 **AGRO00**
2 4 7 6 0 0  **3 9 4 8 1 1 0 Ext. 5**

APLICACIÓN PARA CELULARES



vigilancia.fitosanitaria@agrocalidad.gob.ec
comunicacion@agrocalidad.gob.ec



*¡línea **única** para emergencias!*

Fecha de acción	Actividades día 1				
	Zanja de 30 x 30 cm	Delimitar el área y colocar pediluvio	Inyección de glifosato	Control de malezas con glifosato	Cubrir la flor macho con plástico
	Actividades día 7				
	Inyección de glifosato				
	Actividades día 20				
	Trozar todos los tallos	Colocar los racimos en fundas	Aplicar una solución de cobre más amonio	Cubrir el área con plástico	