



AGROCALIDAD

AGENCIA DE REGULACIÓN Y
CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE BROTES DE *Ralstonia solanacearum* Raza 2

🌴 Síntomas

1 Amarillamiento de la hoja bandera que empieza por los márgenes




2 El racimo frutal presenta una maduración desigual y la pulpa de la fruta una pudrición interna



3 En hijuelos, las hojas se amarillan, se secan y mueren



🌴 Manejo de zona roja



- Utilizar ropa, botas y herramientas exclusivas.
- Restringir el paso del personal.
- Bloquear los sistemas de riego y drenaje.
- No arrojar material a zonas de cultivo o fuentes de agua.
- No permitir la cosecha, ni la extracción de material de propagación de esta zona.
- Capacitar al personal.

Ante la sospecha de Ralstonia Comunícate con Agrocalidad

1 800 **AGRO00**  **3 948 110 Ext. 5**
2 476 00

APLICACIÓN PARA CELULARES



vigilancia.fitosanitaria@agrocalidad.gob.ec
comunicacion@agrocalidad.gob.ec

Fecha de acción

Actividades día 1

Zanja de 30 x 30 cm

Delimitar el área y colocar pediluvio

Inyección de glifosato

Control de malezas con glifosato

Cubrir la flor macho con plástico

Actividades día 7

Inyección de glifosato en rebrotes

Actividades día 20

Trozar todos los tallos

Colocar los racimos en fundas

Aplicar una solución de cobre más amonio

Cubrir el área con plástico