



AGROCALIDAD

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO

¡Amigo palmicultor! conoce sobre la pudrición del cogollo

RECONOCIMIENTO DE PRINCIPALES SÍNTOMAS EN CAMPO



La Pudrición del Cogollo (PC), inicia con el amarillamiento (clorosis) de las hojas nuevas de la parte central llamada cogollo y termina en la pudrición de los tejidos con emisión de un olor fétido.



MANEJO INTEGRADO DE LA PC

- Realizar rondas fitosanitarias periódicas con personal capacitado en el reconocimiento de la PC y ante síntomas característicos intervenir con el protocolo de erradicación.
- Controlar de manera obligatoria la gualpa (*Rhynchophorus palmarum*) mediante un sistema de trapeo masivo.
- Realizar prácticas en vivero y en campo.



Identificación de la PC



Trampa para gualpa

PRÁCTICAS EN VIVERO



Usa semillas certificadas



Utiliza agua de buena calidad



Implementa un pediluvio para desinfectar el calzado



Registra tu vivero en Agrocalidad



Denuncia el traslado ilegal de palma

PRÁCTICAS DE CAMPO



Evita la siembra en lotes donde estuvo la enfermedad



Maneja los drenajes



Maneja la nutrición de tu cultivo



Trapeo obligatorio de gualpa

ERRADICACIÓN DE PALMAS CON PC

Las palmas con PC deben ser erradicadas con el fin de disminuir la fuente de inóculo, para que no se conviertan en foco de diseminación.

Agrocalidad recomienda el método de erradicación con inyección de herbicida al estípite.



Formar 3 orificios alrededor de la palma a 50 cm desde el suelo



Inyectar 150 - 250 ml de herbicida / palma



Sellar los orificios con cemento



Aplicar al cogollo 1 litro de solución de insecticida al 0.5%

RECUERDA: Un buen Manejo Integrado en tu plantación te ayudará a evitar la PC; para mayor información comunícate con los técnicos de AGROCALIDAD.