

# Hospedantes (incluye heliconias)

Los principales hospederos de Foc R4T son las especies de *Musa* y *Heliconia*. Foc R4T es fuertemente patogénico para la variedad Cavendish (AAA) de banano (*Musa acuminata*), comercialmente importante.

**Cuadro 1.** Hospederos de *Fusarium oxysporum* f. sp. *cupense* Raza 4 Tropical.

| Especie hospedera                                              | Nombre común                       | Familia       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Hospederos principales:                                        |                                    |               |
| <i>Heliconia caribaea</i> <sup>1</sup>                         | Heliconia                          | Heliconaceae  |
| <i>Heliconia mariae</i> <sup>1</sup>                           | Heliconia                          | Heliconaceae  |
| <i>Heliconia psittacorum</i> <sup>1</sup>                      | Heliconia                          | Heliconaceae  |
| <i>Musa</i> sp.                                                | Musáceas                           | Musaceae      |
| <i>Musa acuminata</i>                                          | Banano                             | Musaceae      |
| <i>Musa balbisiana</i>                                         | Plátano                            | Musaceae      |
| <i>Musa textilis</i>                                           | Abacá                              | Musaceae      |
| <i>Musa shizocarpa</i> <sup>2</sup>                            | Banana silvestre (con semillas)    | Musaceae      |
| Hospederos secundarios:                                        |                                    |               |
| <i>Paspalum fasciculatum</i> <sup>3</sup>                      | Gramalote                          | Poaceae       |
| <i>Panicum purpurascens</i> <sup>3</sup>                       | Zacate pará                        | Poaceae       |
| <i>Commelina diffusa</i> <sup>3</sup>                          | Siempre viva                       | Commelinaceae |
| <i>Chloris inflata</i> <sup>4</sup> sin <i>Chloris barbata</i> | Zacate borrego                     | Poaceae       |
| <i>Euphorbia heterophylla</i> <sup>4</sup>                     | Leche vana, lechosa, leche de sapo | Euphorbiaceae |
| <i>Tridax procumbens</i> <sup>4</sup>                          | Maleza                             | Asteraceae    |
| <i>Cyanthium cinereum</i> <sup>4</sup>                         | Maleza                             | Asteraceae    |
| <i>Cyperus iria</i> <sup>5</sup>                               | Maleza                             | Cyperaceae    |
| <i>Cyperus rotundus</i> <sup>5</sup>                           | Maleza                             | Cyperaceae    |
| <i>Fimbristylis koidzumiana</i> <sup>5</sup>                   | Maleza                             | Cyperaceae    |
| <i>Gnaphalium purpureum</i> <sup>5</sup>                       | Maleza                             | Asteraceae    |